


Für konventionelle bzw. Kombi-Spritzfolgen

WEINBAUEMPFEHLUNG								
								
Rebstadium	Austrieb–Vorblüte	Vorblüte	Letzte Vorblüte	Abg. Blüte	Nachblüte	Traubenschluss	Reifebeginn	Abschluss
Empfohlene Wassermenge	100–400 l/ha	100–400 l/ha	200–800 l/ha	250–800 l/ha	300–800 l/ha	400–800 l/ha	400–800 l/ha	400–800 l/ha
Basisaufwand-Multiplikator	1	1–2	2–2,5	2,5	3	4	4	4
Oidium	 3,6 kg/ha 4,8 kg/ha		 0,4–0,5 l/ha	Wirkstoffklassenwechsel, 2x		 0,8 l/ha	 185 g/ha, 2x oder  0,32 l/ha, 2x	
Peronospora	Folpan 80 WDG*		 0,72 – 1,44 kg/ha	 0,32–0,40 kg/ha	Folpan 80 WDG* + Veriphos*, 2x		 0,48 kg/ha	 2,0 l/ha, 2x oder  1,25 kg/ha, 2x  2,5 kg/ha, 2x
Botrytis						 0,96 kg/ha	 0,96 kg/ha	
* Registrierte Marke der ADAMA Deutschland GmbH 1) Inklusive Zulassung gegen Schwarzfäule und Roter Brenner 2) Inklusive Zulassung gegen Roter Brenner 3) Inklusive Zulassung gegen Schwarzfäule 4) Genehmigung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gegen Rebenpockenmilbe und Rebstock-Kräuselmilbe 5) Hinweis: Einsatz nur, wenn nicht bereits zum Traubenschluss erfolgt 6) Einsatz Metalaxyl-M-haltiger Fungizide max. 1x/Saison								