



Produktprofil:

Wirkstoff: 40 g/l Tetraconazole (G1)

Formulierung: ME - Mikroemulsion

Zulassung: Echter Mehltau (*Uncinula necator*) in Tafel- und Keltertrauben

Verteilung: Systemisch

Wirkung: Protektiv

Anwendung: spritzen oder sprühen

Basisaufwandmenge:

0,3 l/ha in max. 400 l/ha Wasser

ES 61: 0,6 l/ha in max. 800 l/ha Wasser


ES 71: 0,75 l/ha in max. 1.200 l/ha Wasser

ES 75: 0,75 l/ha in max. 1.200 l/ha Wasser

Wartezeit: 28 Tage



Fungizid gegen Echten Mehltau



Beratung



**Zentraler Fachberater
Weinbau**

- Dr. Stephan Reimann
- Telefon 0172 - 630 21 21
- stephan.reimann@belchim.com



**Zentraler Fachberater
Obst, Gemüse, Hopfen, Zierpflanzen**

- Daniel Rieger
- Telefon 0170 - 573 19 58
- daniel.rieger@belchim.com



**Beratung
Obstbau**

- Uwe Oswald
- Telefon 0177 - 754 39 61
- u.osswald@proagro-gmbh.de



**Vertriebsberater Sonderkulturen
Norddeutschland**

- Arne Schulz
- Telefon 0160 - 944 864 33
- arne.schulz@belchim.com



**Vertriebsberater Sonderkulturen
Süddeutschland**

- Engelbert Lanz
- Telefon 0174 - 9447183
- engelbert.lanz@belchim.com



**Key Account
Sonderkulturen**

- Verena Lange
- Telefon 0171 - 304 36 10
- verena.lange@belchim.com

© - registrierte Warenzeichen der Hersteller. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Stand: September 2020



Belchim Crop Protection Deutschland GmbH
Wollenweberstraße 22, 31303 Burgdorf | T.: +49 5136-92038-0 | F.: +49 5136-92038-60
www.belchim-agro.de | info-de@belchim.com



SARUMO®

- Schützt vorbeugend gegen **Echten Mehltau**
- Zusatzwirkung auf Schwarzfäule*
- Flexibler Einsatz in Mischungen oder solo

*Eigene Erfahrungen, keine Zugelassene Indikation



SARUMO® der Schutz für Tafel- und Keltertrauben


Die schnelle Aufnahme in das Blatt schützt den Wirkstoff vor Abwaschung durch Regen und sichert so die Wirkung.

Wirkungsweise

Sarumo® wirkt vorbeugend gegen Echten Mehltau und zeichnet sich durch eine gute Regenfestigkeit aus. Der Wirkstoff dringt schnell über Blätter und Stängel in die Pflanze ein und ist dadurch vor der Abwaschung durch Regen geschützt.

Sarumo® wird nach der Aufnahme systemisch verlagert, wodurch auch nicht benetzte Pflanzenteile effektiv geschützt sind.


Verteilung in der Pflanze:



SARUMO® wird schnell in die Pflanze aufgenommen und dort gleichmäßig verteilt. So bietet der Wirkstoff einen sicheren vorbeugenden Schutz gegen Echten Mehltau.

Versuchsergebnisse

Wirksamkeit gegen Echten Mehltau (*Uncinula necator*)



Anwendungszeitraum:

- **Anwendungszeitpunkt:** bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
- **Behandlungsintervalle:** max. 3x je Kultur/Jahr, Abstand: 10-14 Tage
- **Stadium:** BBCH 55-79

